



Guia Completo de Vacinação do Seu Cão

O Escudo da Saúde Canina

E-book exclusivo UAU Vet – Saúde e Bem-Estar para o seu Pet

A vacinação é o pilar mais importante da saúde preventiva do seu cão. As vacinas protegem contra doenças graves e muitas vezes fatais, como Cinomose, Parvovirose e Raiva. Seguir o calendário à risca, especialmente na fase de filhote, é essencial para construir uma imunidade forte e duradoura.

■ ■ *Esquema Básico de Vacinação para Filhotes (6 a 16 Semanas)*

Idade do Filhote	Vacina Essencial	Doses	Proteção Contra
6 a 8 Semanas (aprox. 45 dias)	1ª Dose da Polivalente (V8 ou V10)	1ª Dose	Cinomose, Parvovirose, Hepatite, Parainfluenza, Adenovírus, Coronavírus e Leptospirose
9 a 11 Semanas	2ª Dose da Polivalente (V8 ou V10)	2ª Dose	Reforço do ciclo primário
12 a 14 Semanas	3ª Dose da Polivalente (V8 ou V10)	3ª Dose	Reforço final do ciclo primário
16 Semanas ou mais (4 meses)	Vacina Antirrábica	Dose Única	Raiva (obrigatória por lei)

Observação: O intervalo entre as doses da Polivalente costuma ser de 21 a 30 dias. O veterinário pode indicar uma 4ª dose para raças específicas (como Rottweilers e Dobermans) ou em áreas de alto risco.

■ *Reforço Anual para Cães Adultos*

Idade do Cão	Vacina Essencial	Doses	Frequência
1 Ano de Idade	Polivalente (V8 ou V10)	Reforço	1 ano após a última dose do filhote
A partir de 1 Ano	Antirrábica	Reforço	Anual
A partir de 1 Ano	Polivalente (V8 ou V10)	Reforço	Anual

■ *Vacinas Opcionais (Conforme Risco)*

Vacina	Recomendação	Esquema Inicial
Gripe Canina (Tosse dos Canis)	Cães que frequentam creches, parques ou hotéis.	2 doses iniciais com 2 a 4 semanas de intervalo (a partir de 8 semanas). Reforço anual.
Giárdia	Cães com acesso a água e solo contaminados (parques, rua).	2 doses iniciais com 2 a 4 semanas de intervalo (a partir de 8 semanas). Reforço anual.
Leishmaniose	Cães em áreas endêmicas (consulte o veterinário).	3 doses iniciais com 21 dias de intervalo (a partir de 4 meses). Reforço anual. Requer teste prévio.

■ *Dicas UAU VET para o Dia da Vacina*

- **Saúde em Primeiro Lugar:** O cão deve estar saudável para ser vacinado. Se estiver com febre, diarreia ou apático, a vacinação deve ser adiada.
- **Isolamento:** Enquanto o filhote não completar o ciclo da Polivalente (após a 3ª ou 4ª dose), evite passeios na rua ou contato com cães de vacinação desconhecida.

- **Vigilância Pós-Vacina:** É comum ocorrer prostração leve ou pequeno inchaço no local. Em caso de vômito, inchaço da face ou dificuldade para respirar, procure um veterinário imediatamente.

Unidades UAU Vet

UAU Vet - Meireles

Rua José Vilar, 1328 - Meireles, Fortaleza - CE

(85) 99748-0538

UAU Vet - Aldeota

R. Dr. José Lourenço, 870 - Aldeota, Fortaleza - CE

(85) 99708-8988