

# COLOSSO POUR ON

— Uso Veterinário

Ectoparasiticida de ampla ação

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina .....	5,0 g
Clorpirifós .....	7,0 g
Citronelal .....	0,5 g
Veículo q.s.p. ....	100,0 mL

## Indicações:

**COLOSSO POUR ON** é um produto indicado para uso dorsal sobre a pele do animal, no combate dos seguintes ectoparasitas que acometem:

Bovinos

Carrapatos (*Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennensis*, *Anocentor nitens*).

Berne, ou larvas de *Dermatobia hominis*.

Moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*).

Piolhos (*Linognathus vituli*,

*Haematopinus eurysternus*).

Sarnas (*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Psoroptes natalensis*, *Chorioptes bovis*).

Suínos

Sarna (*Sarcoptes scabiei* var. *suis*).

Moscas (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Dermatobia hominis*).

## Modo de uso e dosagem:

Bovinos:

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela abaixo:

Peso	Dose
100 kg .....	10 mL
200 kg .....	20 mL
300 kg .....	30 mL
400 kg .....	40 mL
500 kg .....	50 mL

Para animais acima de 500 kg

de peso corporal, a dose máxima recomendada é de 50 mL.

O produto deve ser aplicado em toda linha dorsal do animal, da inserção da cauda até o meio do pescoço.

Suínos:

A dosagem recomendada é de 5 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela abaixo:

Peso	Dose
50 kg .....	2,5 mL
100 kg .....	5,0 mL
150 kg .....	7,5 mL
200 kg .....	10,0 mL
250 kg .....	12,5 mL
300 kg .....	15,0 mL

O produto deve ser aplicado em toda linha dorsal do animal, da inserção da cauda até o meio do pescoço.

#### **Intervalo entre doses:**

A frequência do tratamento dependerá da infestação e do manejo integral da praga, baseado no limiar de infestação e dinâmica populacional.

#### **Contraindicações e limitações de uso:**

Não aplicar em animais extremamente debilitados.  
Não aplicar em pele lesionada.  
Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.  
Não aplicar em animais recém-nascidos.  
Não aplicar o produto nas horas de calor muito intenso.

#### **Precauções:**

Evitar a aplicação em animais debilitados, exaustos ou estressados. Não aplicar o produto nas horas de calor muito intenso.  
Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.  
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber e após o trabalho com o produto.  
Não fumar quando estiver trabalhando com o produto.  
Conservar o produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, longe do alcance de crianças e animais domésticos.  
Não contaminar rios e outros

curso de água.

Produto tóxico para peixes.

Se o produto atingir os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante durante 15 minutos.

Se ocorrer intoxicação acidental proceder da seguinte maneira:

Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Procurar atendimento médico.

### **Interações medicamentosas:**

Inibidores da oxidase de função mista [p.ex. butóxido de piperonila e N-octil-bicicloptano dicarboxilamida (MGK-264)] suprimem a hidrólise de piretrinas e piretrides, potencializando sua atividade. Fármacos que ativam os receptores colinérgicos, relaxantes musculares periféricos e organoclorados devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazônicos aumentam a

toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

### **Reações adversas:**

Os piretroides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos. Geralmente são seguros, mas eventualmente podem causar alergia, náusea, vômito e cefaleia.

Os organofosforados podem ocasionar efeitos adversos como salivação, lacrimejamento, micção, defecação, dispneia, fasciculação, ataxia e convulsões (em casos de má administração de doses ou intoxicações acidentais).

### **Informações para uso médico:**

Cipermetrina: é um piretroide e não possui antídoto específico. Fazer tratamento sintomático. Clorpirifós: é um organofosforado, cujo antídoto é o Sulfato de Atropina.

## **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA**

### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE  
PRODUTO SOMENTE DEVE SER  
REALIZADO 10 DIAS APÓS A  
ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE  
PRODUTO NÃO DEVE SER  
DESTINADO AO CONSUMO  
HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A  
ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE  
PRODUTO.**

### **SUÍNOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS  
TRATADOS COM ESTE  
PRODUTO SOMENTE DEVE SER  
REALIZADO 10 DIAS APÓS A  
ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO  
EM CONDIÇÕES DIFERENTES  
DAS INDICADAS NESTA BULA  
PODE CAUSAR A PRESENÇA DE  
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES  
APROVADOS, TORNANDO O  
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL  
IMPRÓPRIO PARA O  
CONSUMO.**

Conservar em local seco e

fresco, entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

### **Responsável Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da  
Agricultura sob  
n.º 8.440 em 13/01/2003.

### **Importado e distribuído por:**

**Moçambique:** Reg.: DSV-868 –  
Tecap – Maputo, Moçambique  
– Tel.: (258) 2146-2916

CUIDADO  VENENO

KIT 50003054/10

KIT 50003059/06

Proprietário e fabricante:  
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
Tel/Fax: 16 3518 2025  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
[www.ourofinaoanimal.com](http://www.ourofinaoanimal.com)  
Indústria brasileira



PAPEL

50003054/10

 **ourofino**  
saúde animal